

# AGRO *plus*™ UNIPRO <sup>CE</sup>

## KONCENTRUOTA TRĄŠA, SKIRTA MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ TRŪKUMUI ATSTATYTI ŽEMĖS ŪKIO AUGALUOSE, TRĘŠIMUI PER LAPUS

Sudėtinės neorganinės mikroelementų trąšos.

PFK 1(C)(1)(b)(i).

Boro (B) (iš kolemanito), kalcio (Ca) (kalcio oksido), mangano (Mn) (mangano karbonato), molibdeno (Mo) (natrio molibdato) ir cinko (Zn) (cinko oksido) suspensinės mikroelementų trąšos.

Boras (B):	3,4 % w/w	5,0 % w/v
Kalcio oksidas (CaO):	7,4 % w/w	10,8 % w/v
Manganas (Mn):	6,1 % w/w	8,9 % w/v
Molibdenas (Mo):	0,27 % w/w	0,4 % w/v
Cinkas (Zn):	4,1 % w/w	6,0 % w/v

Boras (B) - 50 g/l, Kalcio oksidas (CaO) - 108 g/l, Manganas (Mn) - 89 g/l, Molibdenas (Mo) - 4 g/l, Cinkas (Zn) - 60 g/l.

Sudėtis: kolemanitas <sup>1</sup> (12291-65-5), mangano karbonatas <sup>1</sup> (CAS 598-62-9), cinko oksidas <sup>1</sup> (CAS 1314-13-2)

Visos medžiagos priklauso CMC1. Pirminės medžiagos medžiagos ir mišiniai.

**Grynasis kiekis:** 7,3 kg

Sudėtyje be jau nurodytų medžiagų yra ir šiuolaikiškų, PAM, tirpalo stabilizatorių, klijų - padedančių tirpalui išlikti ant augalo dalių.

**Produkto forma:** koncentruota suspensija (SC)

### NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKOTARPIS

**Pievos, ganyklos, dobilai ir liucerna:** rudenį prieš žiemojimą ir pavasarį vegetacijai atsinaujinus.

Norma: 1,0 litras hektarui. Praėjus 5-10 dienų po kiekvieno žolės nupjovimo/nuganyimo norma: 1,0-1,5 litrai hektarui.

**Pupos ir žirniai:** naudoti ankstyvose stadijose, kai augalai jau turi pakankamą lapų paviršių purškiamam mišiniui pasisavinti. Kartoti, esant poreikiui, po 10-14 dienų.

**Norma:** 0,5 - 1,0 litrai hektarui.

Naudoti tik tada, kai yra nustatytas poreikis. Neviršykite rekomenduojamų naudojimo normų. Rekomenduojama atlikti dirvožemio ir augalo audinių analizę kai tik įmanoma, norint nustatyti mikro ir makroelementų naudojimo poreikį bei siekiant optimizuoti pasėlių maistinių medžiagų būklę.

**Nenaudoti su herbicidais.**

### VANDENS TŪRIS

Naudoti ne mažiau 200 litrų vandens į 1 ha. Užtikrinti visos lapijos padengimą tirpalu.

### DĖMESIO!

Geriausi rezultatai gaunami AGROPLUS UniPro trąšas purškiant anksti ryte arba vakare, kai augaluose yra drėgmės. Nenaudoti augalams pažeistiems ankstesnių purškimų, šalčio, labai ryškios saulės šviesos, didelių temperatūrų ar sausros.

### MAIŠYMAS

**Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!**

Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvų rezervuarą reikiamu vandens kiekiu ir įjungti maišyklę. Maišant į rezervuarą lėtai įpilti reikiamą AGROPLUS UniPro trąšų kiekį. Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir nedelsiant naudoti.

Neleisti mišiniui stovėti be maišymo. Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.