

# AGROplus™ RAPSAMS



## KONCENTRUOTA TRĄŠA, SKIRTA MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ TRŪKUMUI ATSTATYTI ŽEMĖS ŪKIO AUGALUOSE, TRĘŠIMUI PER LAPUS

Paprastosios skystosios neorganinės makroelementų trąšos. PFK 1(C)(I)(b)(i).

Azoto (N) ir Sieros (S) trąšos su mikroelementais

Suminis azotas (N):	4,1 % w/w,	6,0 % w/v
Karbamidinis azotas :	4,1 % w/w,	6,0 % w/v
Siera oksido formoje (SO <sub>3</sub> ):	28,0 % w/w,	40,9 % w/v
Boras (B):	3,5 % w/w,	5,11 % w/v
Manganas (Mn):	6,3 % w/w,	9,20 % w/v
Molibdenas (Mo):	0,3 % w/w,	0,44 % w/v
Cinkas (Zn):	4,9 % w/w,	7,15 % w/v

**Sudėtis:** Monoetanolamino ir boro rūgšties reakcijos produktai (1:3)<sup>1</sup> (CAS 26038-87-9), mangano karbonatas<sup>1</sup> (CAS 598-62-9), siera<sup>1</sup> (CAS 7704-34-9), karbamidaz<sup>1</sup> (CAS 57-13-6), cinko oksidas<sup>1</sup> (CAS 1314-13-2). Visos medžiagos priklauso <sup>1</sup>CMC1. Pirminės medžiagos ir mišiniai.

Suminis azotas (N) - 60 g/l, Siera oksido formoje (SO<sub>3</sub>) - 409 g/l, Boras (B) - 51 g/l, Manganas (Mn) - 92 g/l, Molibdenas (Mo) - 4,4 g/l, Cinkas (Zn) - 71 g/l.

**Produkto forma:** koncentruota suspensija (SC)

Grynasis kiekis: 7,2 kg

### PASKIRTIS

**Naudoti tik tada, kai yra nustatytas poreikis. Neviršykite rekomenduojamų naudojimo normų.**

Tai unikali formuliacija mangano, cinko, boro ir molibdeno mišinys su azoto ir sieros priedu skirtas naudoti tręšimui per lapus rapsams, kopūstams, žirniams ir pupoms.

Mišiniui paruošti naudojami pažangūs gamybos būdai, pagerinantys suderinamumą maišant talpoje su kitais preparatais, padengimą ant augalų bei lipniąsias savybes.

Taip pat spartesnis purškiamo mišinio įsiskverbimas į augalus bei augalų maistinių medžiagų įsisavinimas į audinius. Rekomenduojama atlikti dirvožemio ir augalo audinių analizę kai tik įmanoma, norint nustatyti mikro ir makroelementų naudojimo poreikį bei siekiant optimizuoti pasėlių maistinių medžiagų būklę.

### NAUDOJIMO NORMOS

Naudoti 1,0 - 3,0 litrus hektarui, priklausomai nuo mikroelementų poreikio.

### NAUDOJIMO LAIKOTARPIS

**Rapsams:** pradėti nuo 4 - 9 lapelių stadijos ir kartoti, esant poreikiui, po 10 - 14 dienų ir tada, kai pradeda greitai ilgėti stiebai.

**Kopūstams:** naudoti ankstyvojoje stadijoje, kai augalai jau turi pakankamą lapų paviršių purškiamam mišiniui įsisavinti. Kartoti, esant poreikiui po 10 - 14 dienų.

Paskutinis apdorojimas - 4 savaitės prieš derliaus nuėmimą.

**Ankštiniams (pupoms, žirniams, sojos pupelėms):** naudoti ankstyvoje stadijoje, kai augalai jau turi pakankamą lapų paviršių mišiniui įsisavinti. Kartoti, esant poreikiui po 10 - 14 dienų.

### VANDENS TŪRIS

Naudoti ne mažiau 200 litrų vandens į 1 ha.

Užtikrinti visos lapijos padengimą tirpalu.

### DĖMESIO!

Nenaudoti augalams pažeistiems ankstesnių purškimų, šalčio, labai ryškios saulės šviesos, labai didelių temperatūrų ar sausras.

Geriausi rezultatai pasiekiami apdorojant augalus anksti ryte arba vakare.

### MAIŠYMAS

**Prieš atidarant ir naudojant pakuotę stipriai supurtyti!**

Purkštuvų įranga privalo būti švari. Pripildyti purkštuvo rezervuarą reikiamo vandens kiekio ir įjungti maišyklę.

Maišant į rezervuarą lėtai įpilti reikiamą AGROPLUS RAPSAMS trąšų kiekį.

Supilti likusį reikiamą kiekį vandens ir nedelsiant naudoti.

Neleisti mišiniui stovėti be maišymo.

Po naudojimo purkštuvą gerai išplauti.