

GOLTIX[®] 700 SC
Goltix[®] 700 g/l k.s.
Herbidas

Veiklioji medžiaga: metamitronas 700 g/l
Koncentruota suspensija

Naudojimo spektras – sisteminis herbicidas. Skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių ir braškių pasėliuose.



KENKSMINGAS



APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!

Kenksmingas prarijus.

Labai toksiška vandens organizmams.

Saugoti nuo vaikų.

Mūvėti tinkamas pirštines.

Prarijus nedelsiant kreipis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

Pakuotė: 5 L

Registracijos Nr. 0179H/99

Pagaminimo data: Žiūrėti ant įpakavimo

Partijos Nr. Žiūrėti ant įpakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:

Makhteshim-Agan Industries Ltd.

Omer Darom Building,

9 Omarim str., P.O.Box 1646

Omer 84965

Israel

Importuotojai ir platintojai Lietuvoje:

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ.
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
PREPARATAS SKIRTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

GOLTIX plataus spektro herbicidas, skirtas naikinti vienametes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių ir braškių pasėliuose.

GOLTIX pasižymi ilgalaikiu poveikiu, nes jis veikia per piktžolių lapus ir per dirvą. Dėl labai mažo fitotoksiškumo jį galima naudoti praktiškai bet kuriame cukrinių runkelių vystymosi tarpsnyje. Rezultatai geriausi, kai dirva pakankamai drėgna, o oro temperatūra – aukštesnė nei +15°C.

Labai jautrios piktžolės (sunaikina >kaip 90%)

Dirvinis bobramunis	Pūdyminė aguona
Plačioji balandūnė	Dėmėtasis rūgtis
Rapsas	Juodoji kiauliuogė
Trikertė žvaginė	Daržinė pienė
Baltoji balanda	Daržinė žliūgė
Vaistinė žvirbliarūtė	Dirvinė čiužutė
Dirvinė aklė	Gailioji dilgėlė
Apskritalapė notrelė	Dirvinė našlaitė
Raudonžiedė notrelė	Vienametė miglė
Vaistinė ramunė	Paprastasis kežys
Bekvapė ramunė	Dirvinė nemiršėlė
Bevainikė ramunė	Paprastoji gaiva
Paprastoji žilė	

Jautrios piktžolės (sunaikina apie 75%)

Šiurkštusis burnotis	Dirvinė notra
Raudonžiedis progailis	Pūdyminė veronika
Dirvinė krapažolė	Dirvinė veronika
Smulkiažiedė galinsoga	Trumpamakštis rūgtis
Takažolė rūgtis	Rūgčiai
Dirvinis garstukas	

Atsparios piktžolės

Kibusis lipikas	Tuščioji aviža
Vienametis laiškenis	Paprastoji rietmenė
Vijoklinis rūgtis	Žalioji šerytė
Triskliautis lakišius	

CUKRINIAI IR PAŠARINIAI RUNKELIAI

Pirmą kartą purškama, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, nepriklausomai nuo cukrinių runkelių išsivystymo tarpsnio. Humusinguose dirvožemiuose labai svarbu nepavėluoti nupurkšti pirmą kartą. Purškama pakartotinai pasirodžius naujai piktžolių bangai. Priklausomai nuo oro sąlygų, tai gali būti po 10-15 dienų.

Nepurškite, jei prognozuojamos šalnos ir esant daugiau nei +22°C, jei dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai, didelis saulės šviesos intensyvumas, jei cukriniai runkeliai pažeisti ligų ir kenkėjų.

GOLTIX efektyvumą galima padidinti naudojant jo ir Betanal eksperto mišinį.

1 purškimas	1 l/ha GOLTIX + 1 l/ha Betanalas ekspertas
2 purškimas	1 l/ha GOLTIX + 1 l/ha Betanalas ekspertas
3 purškimas	1 l/ha GOLTIX + 1 l/ha Betanalas ekspertas

VANDENS KIEKIS: 200-300 l/ha.

VALGOMIEJI BUROKĖLIAI

Burokėliai purškiami dviejų tikrųjų lapelių tarpsnyje piktžolėms turint 2-4 tikruosius lapelius. Jei burokėlių daigai silpni, geriau palaukti, kol jie sustiprės.

GOLTIX rekomenduojama norma 3-4 l/ha.

VANDENS KIEKIS: 200-300 l/ha.

BRAŠKĖS

GOLTIX galima naudoti tiek naujai pasodintame, tiek ir derančiame braškyne iki jų žydėjimo pradžios. Jaunų braškių pasėlyje po pirmo tarpueilių dirvos purenimo piktžolėms naikinti galima purkšti GOLTIX. Nuo sodinimo iki purškimo GOLTIX turi praeiti 20-25 dienos.

NORMA: 4 l/ha.

VANDENS KIEKIS: 200-400 l/ha.

Derančiame braškyne po pirmo tarpueilių dirvos purenimo piktžolėms naikinti galima purkšti GOLTIX, taip pat galima purkšti ir pakartotinai nusukynus uogas prieš tai išpurenus braškyno tarpueilius.

NORMA: 5 l/ha

VANDENS KIEKIS: 200-400 l/ha.

MAIŠYMAS

Herbicidas gali būti maišomas su priešvarpiniais herbicidais, taip pat su alyva. Nerekomenduojama preparato maišyti su insekticidais. GOLTIX negalima maišyti su skystomis trąšomis. Tarp purškimo trąšomis ir GOLTIX turi praeiti ne mažiau kaip 3 dienos.

TIRPALO RUOŠIMAS

Į purkštuvą supilamas GOLTIX ir išmaišomas nedideliame vandens kiekyje, po to pripildoma vandens ir supilamas Betanolas ekspertas. Prieš tai tarą su preparatu suplakite rankomis. Vandens kiekis neturi viršyti 300 l/ha. Preparatų maišymo ir purškimo metu maišyklė turi būti įjungta. Tirpalą išpurkšti per 6 valandas.

Tuščią tarą reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Prieš pradėdant darbą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštuvų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant preparatus, purkštuvo talpą, vamzdynus reikia išplauti švariu vandeniu.

TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS

Tuščią tarą uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis vietinių reikalavimų ir taisyklių. Naudoti kitiems tikslams **draudžiama!**

SAUGOJIMAS

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atskirai nuo maisto produktų, vandens ir pašarų. Ne aukštesnėje kaip 40°C ir ne žemesnėje kaip –10°C temperatūroje. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA

Preparatas nedegus, tačiau gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (anglies monoksidas, ciano vandenilis, azoto oksidas). Gesinant dėvėti dujokaukes su kombinuotais filtrais. Gesinti vandeniu, anglies dioksidu, gesinimo milteliais, putomis, smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti padaryti laikinas žemės sankasas.

SAUGOS PRIEMONĖS

Negalima valgyti, rūkyti, gerti.

Darbo metu dėvėti asmenines apsaugos priemones, specialią aprangą, gumines pirštines ir kaukę. Saugotis, kad preparato nepatektų į kvėpavimo takus, akis, virškinimo traktą. Dirbant lauke atkreipti dėmesį į vėjo kryptį, stengtis neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Pavojingas akims, dėvėkite apsauginius akinius. Jei preparato pateko ant odos, reikia nuplauti švariu vandeniu ir muilu. Jei preparato pateko į akis, nedelsiant gerai nuplauti švariu vandeniu. Nuodingas nurijus. Baigus darbą nusiprausti vandeniu ir muilu, persirengti. Tuščią tarą padėti tam skirtoje vietoje, naudoti kitiems tikslams draudžiama.

PIRMOJI PAGALBA

Patekus ant odos

Reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti švariu vandeniu su muilu.

Patekus į akis

Reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus

Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Priešnuodžio nėra. Triazinonų grupės preparatas. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052**

PASTABA

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.